

SLMC 13 ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා විසඳුම්

1. පහත දැක්වෙන සාධනය සලකන්න

පියවර 1: $x = y + 1$ ලෙස ගනිමු

පියවර 2: එවිට $2019x - 2018x = 2019y - 2018y + 2019 - 2018$

පියවර 3: නැවත සකසා සාධක ගැනීමෙන්,

$$2019(x - y - 1) = 2018(x - y - 1)$$

පියවර 4: $x - y - 1$ කපා හැරීමෙන් $2019 = 2018$

ඔබට නිගමනය කළ හක්කේ කුමක්ද?

- I. පියවර 1 වැරදිය
- II. පියවර 2 වැරදිය
- III. පියවර 4 වැරදිය

(A) I පමණි

(B) II පමණි

(C) III පමණි

(D) I සහ II පමණි

(E) I සහ III පමණි

විසඳුම


$x - y - 1 = 0$ ($x = y + 1$ නිසා) නිසා, 4 වැනි පියවරේදී $x - y - 1$ කපා හැරීම යනු ශුන්‍යයෙන් බෙදීම නිසා පියවර 4 නිවැරදි නොවේ. ශුන්‍යයෙන් බෙදීම කළ හැකි නම් ඕනෑම සංඛ්‍යා දෙකක් සමාන බව පෙන්විය හැකිය. x හා y යනු ඕනෑම සංඛ්‍යා දෙකක් නම් $x.0 = y.0$ වේ. ශුන්‍යයෙන් බෙදූ විට $x = y$ වේ.

සටහන මෙම ගැටලුව SLMC 2007 හි 29 වන ගැටලුව වේ. ගැටලුවක් විසඳීමෙන් එම ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් සිතීම නැවතිය නොයුතුය. ගැටලුවක් විසඳූ පසු එම විසඳුම ගැන නැවත සිතා බැලීම (looking back) ගැටලුවක් විසඳීමේ ක්‍රියාවලියේ ඉතා වැදගත් අංගයක් බව ජෝර්ජ් පොලියා (George Polya) ඔහුගේ (*How to Solve It*) පොතේ සඳහන් කරයි.

මෙම ගැටලුවේ t_n යනු භාවා d_{n-1} දුරක් යෑමට ගත කරන කාලය වේ. මෙම කාලය සෑම විටම ධන නිසා එම කාලය ඇතුළත ඉබ්බා කිසියම් දුරක් ($d_n = vt_n$) යයි. එනම් ඉබ්බා සැමවිටම භාවාට ඉදිරියෙන් සිටී. එනම් භාවාට ඉබ්බා අල්ලා ගත නොහැකිය. එනම් භාවාට ඉබ්බා පසු කර යෑමට නොහැකිය. මෙය III ප්‍රකාශයටත් සාමාන්‍ය බුද්ධියටත් (common sense) පටහැනිය.

මෙම ගැටලුව පදනම් වී ඇත්තේ සීනෝගේ අකිලීස් හා ඉබ්බාගේ විරුද්ධාභාසය (Zeno's Achilles and the Tortoise paradox) මත වේ. මෙම විරුද්ධාභාසයේදී පහත අයුරින් තර්කයක් සීනෝ (Zeno) ඉදිරිපත් කර ඇත. සීනෝ (Zeno) යනු 490–430 BC පමණ කාලයේ විසූ ග්‍රීක ආර්ථිකයෙකු වේ. අකිලීස් යනු ග්‍රීක පුරාකථා සංග්‍රහයේ එන රණ ශූරයෙකි. අකිලීස් හා ඉබ්බා අතර තරඟයේදී අකිලීස් ඉබ්බාට යම් දුරක් පිටුපසින් එකම වේලාවේදී තරඟය ආරම්භ කරයි. අකිලීස් ඉබ්බා ඇල්ලීමට නම් ඉබ්බා තරඟය ආරම්භයේදී සිටී තැනට මුලින් පැමිණිය යුතුය. එයට යම් කාලයක් ගත වන අතර එම කාලයේදී ඉබ්බා යම් දුරක් යන අතර ඉබ්බා නැවතත් ඉදිරියෙන් සිටියි. නැවතත් අකිලීස්ට ඉබ්බා ඇල්ලීමට අකිලීස් ඉබ්බාගේ ආරම්භක ස්ථානයට පැමිණෙන විට ඉබ්බා සිටී ස්ථානයට පැමිණිය යුතුය. මෙම තර්කය නැවත නැවත යෙදිය හැකිය. එවිට ඉබ්බා සැම විටම අකිලීස්ට ඉදිරියෙන් සිටී. මෙම තර්කය කෙසේ බිඳ දැමිය හැකිද? □

2. ABC යනු C හි සෘජු කෝණයක් පවතින ත්‍රිකෝණයකි. AC , BC සහ AB හි දිග පිලිවෙළින් a , b සහ c වේ. C ශීර්ෂයේ සිට AB ට ඇඳි ලම්බකයේ උස h වන අතර, එමගින් AB පිලිවෙළින් m හා n දිගින් යුත් කොටස් දෙකකට බෙදේ. පහත ඒවායින් සත්‍ය නොවන්නේ කුමක්ද ?



(A) $\frac{a^2}{b^2} = \frac{m}{n}$

(B) $n = \frac{b^2}{c}$


(C) $h^2 = mn$

(D) $\frac{h^2}{n} = \frac{b^2}{c}$




(E) $h = \frac{ab}{c}$

විසඳුම

$\angle CAH = \angle BCH$.



දී ඇති වරණ වල ඇති සම්බන්ධතා දිග වල් අතර ඇති අනුපාත සම්බන්ධයෙන් වේ. සමරූපී ත්‍රිකෝණ වල අනුරූප පාද වල දිග එකම අනුපාතයෙන් වන නිසා ABC ත්‍රිකෝණයේ ඇති සමරූපී ත්‍රිකෝණ මොනවාදැයි සොයමු.



$HAC\Delta, HCB\Delta$ සහ $CAB\Delta$ සියල්ල සමරූපී වේ. එම නිසා $\frac{h}{m} = \frac{n}{h} \Rightarrow h^2 = mn$. එමනිසා (C) සත්‍ය වේ. $\frac{n}{b} = \frac{b}{c} \Rightarrow n = \frac{b^2}{c}$. එමනිසා (B) සත්‍ය වේ. $\frac{h}{b} = \frac{a}{c} \Rightarrow h = \frac{ab}{c}$ වේ. එමනිසා (E) සත්‍ය වේ. තවද, $\frac{a}{m} = \frac{c}{a} \Rightarrow a^2 = mc$ සහ $n = \frac{b^2}{c} \Rightarrow b^2 = nc$ වේ. එනම්, $\frac{a^2}{b^2} = \frac{mc}{nc} = \frac{m}{n}$ වේ. එමනිසා (A) සත්‍ය වේ.

එනම්, (D) $\frac{h^2}{n} = \frac{b^2}{c}$ යන්න සත්‍ය නොවිය යුතුය. දැන් $\frac{h^2}{n} = m$ සහ $\frac{b^2}{c} = n$ වේ. එනම් $\frac{h^2}{n} = \frac{b^2}{c}$ වීම $m = n$ වේ. නමුත් m, n ට සමාන විය යුතුම නැත. එමනිසා පිළිතුර (D) වේ. $\square$

3. පැතිවල දිග පූර්ණ සංඛ්‍යා වූත් අරය ඒකක 2ක් වූ වෘත්තයක් අන්තර්ගත කර ඇතිවූත් සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක උපරිම වර්ගඵලය වන්නේ,


(A) 24

(B) 30


(C) 54

(D) 60

(E) 48



විසඳුම



$AQ = AR = 2, BR = BP, CQ = CP$. $BR = BP = x$ හා $CQ = CP = y$ ලෙස ගනිමු.

දැන් පෙනෙගරස් ප්‍රමේයයෙන්, $(x + 2)^2 + (y + 2)^2 = (x + y)^2$ බව ලැබේ. මෙය ප්‍රසාරණයෙන්

$$x^2 + 4x + y^2 + 4y + 8 = x^2 + 2xy + y^2 \text{ බව ලැබේ.}$$

$$4x + 4y - 2xy + 8 = 0$$

$$\Rightarrow 2x + 2y - xy + 4 = 0$$

$$\Rightarrow (x - 2)(y - 2) = 8$$

$$\Rightarrow (x - 2 = 1 \text{ සහ } y - 2 = 8) \text{ හෝ } (x - 2 = 2 \text{ සහ } y - 2 = 4)$$

$$\Rightarrow (x = 3 \text{ සහ } y = 10) \text{ හෝ } (x = 4 \text{ සහ } y = 6)$$

$$x = 3 \text{ සහ } y = 10 \text{ නම්, වර්ගඵලය} = \frac{1}{2} \times 5 \times 12 = 30 \text{ සහ}$$

$x = 4$ සහ $y = 6$, නම්, වර්ගඵලය $= \frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 24$
එහෙයින් උපරිම වර්ගඵලය 30 කි. එමනිසා පිළිතුර (B) වේ. $\square$